

SMITTSKYDDSBLAD

Patientinformation

Latent tuberkulos när behandling ej ges

Översatt till spanska

Version 2022-04-11

Tuberculosis latente, información para el paciente

En qué casos no se indica tratamiento preventivo. Hoja informativa de los especialistas en control de enfermedades infecciosas.

¿Cómo se contagia la tuberculosis?

Una persona con tuberculosis en los pulmones puede contagiar a otros cuando tose en lugares cerrados. La tuberculosis en otros órganos y la tuberculosis latente no contagian. Es poco frecuente que los niños contagien antes de la pubertad. El riesgo de contagio es mayor si se pasa mucho tiempo en la misma habitación, por ejemplo, si se comparte la vivienda.

¿Qué es la tuberculosis latente?

No todas las personas que se contagian enferman de tuberculosis. En la mayoría de las personas las defensas inmunológicas del cuerpo detienen el aumento de las bacterias. Las bacterias permanecen en el cuerpo, pero no están activas. Este estado es denominado **tuberculosis latente**.

La tuberculosis latente no es una enfermedad

Si después de un análisis de sangre (prueba IGRA) o prueba cutánea (prueba de la tuberculina) te informan que tienes tuberculosis latente, no tienes síntomas debido a la tuberculosis. No puedes propagar esas bacterias a otras personas.

No obstante, existe el riesgo de desarrollar la enfermedad de tuberculosis en otro momento de la vida, pero el riesgo es pequeño. Por ese motivo, en la mayoría de los casos no se indica ningún tratamiento a quienes tienen tuberculosis latente.

Tratamiento preventivo en ciertos casos

En algunos casos se ofrece un tratamiento preventivo a las personas que corren mayor riesgo de enfermar en otro momento de la vida. Es el caso del embarazo y después del parto, los niños y jóvenes y las personas con defensas inmunológicas debilitadas, por ejemplo, por tratamiento de cáncer, diabetes tratada con insulina, o enfermedad renal grave. También se brinda tratamiento preventivo a las personas que recientemente han estado expuestas al contagio de la tuberculosis.

Contacto con el médico

Tienes tuberculosis latente pero tu médico evalúa que no necesitas tratamiento en este momento. Si en el futuro padeces de tos prolongada (durante más de tres semanas), sudoración nocturna, fiebre o bajas de peso involuntariamente, contacta al médico para que examine si tienes tuberculosis. También debes contactar al médico si estás embarazada, sufres de diabetes tratada con insulina, enfermedad renal grave, tratamiento para el cáncer o defensas inmunológicas debilitadas por otra causa. En esos estados corres mayor riesgo de enfermarte de tuberculosis.

Datos de contacto (*Kontaktuppgifter*)

Nombre de la clínica *Namn på mottagningen*

.....

No. de teléfono/horario de atención telefónica de la clínica (*Telefonnummer/telefonid till mottagningen*)