

SMITTSKYDDSBAD

Patientinformation

Översättning till Tigrinja (byt ut till aktuellt språk)

Version 2020-07-24 (byt ut till aktuell version)

مخفی تپ دق، مریض کی لئے معلومات

جب حفاظتی علاج نہیں دیا جاتا ہے۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹروں کی معلوماتی شیٹس

تپ دق کیسے منتقل ہوتا ہے؟

پھیپھڑوں میں تپ دق کا شکار شخص اس وقت دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے جب وہ شخص کسی بند جگہ کھانستا ہے۔ دوسرے اعضاء کی تپ دق اور مخفی تپ دق متعدی نہیں ہیں۔ بلوغت سے پہلے بچوں کا متعدی ہونا غیر معمولی بات ہے۔ اگر آپ ایک ہی کمرے میں طویل وقت گزارتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مریض کے ساتھ ایک ہی گھرانے میں رہتے ہیں، تو ایسے صورت میں انفیکشن ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔

مخفی تپ دق کیا ہے؟

ہر کوئی جو تپ دق سے متاثر ہوتا ہے وہ تپ دق کا بیمار نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں، جسم کی دفاعی قوتیں بیکٹیریا کی افزائش کو روک سکتی ہیں۔ بیکٹیریا جسم میں تو رہ سکتے ہیں لیکن فعال نہیں ہوتے۔ اس حالت کو **مخفی تپ دق** کہتے ہیں۔

مخفی تپ دق کوئی بیماری نہیں ہے

آپ جن کو خون کے ٹیسٹ (IGRA ٹیسٹ) یا جلد کے ٹیسٹ (ٹبرکولن ٹیسٹ) کے بعد بتایا گیا ہو کہ آپ تپ دق کی مخفی شکل میں مبتلا ہیں، اور ایسی حالت میں بیماری کی کوئی علامات نہیں ہیں جو تپ دق کی وجہ سے ہوں۔ ایسی حالت میں آپ بیکٹیریا کو دوسرے لوگوں میں نہیں پھیلا سکتے۔

تاہم، ایندہ زندگی میں تپ دق پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس خطرے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس لئے زیادہ تر معاملات میں ان لوگوں کو کوئی علاج دینے کی ضرورت نہیں ہے جن کو مخفی تپ دق ہے۔

بعض صورتوں میں حفاظتی علاج دیا جاتا ہے

وہ لوگ جن میں بیمار ہونے کا خطرہ بعد میں بڑھ جاتا ہے انہیں حفاظتی علاج کی پیشکش کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر حمل کے دوران اور ولادت کے بعد، بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کمزور مدافعتی نظام والے لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، مثال کے طور پر کینسر کے علاج، انسولین سے علاج شدہ ذیابیطس، گردے کی شدید بیماریوں کے لئے۔ حفاظتی علاج بعض اوقات ان لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے جو حال ہی میں تپ دق کے انفیکشن کا شکار ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر سے رابطہ

آپ کو مخفی تپ دق ہے لیکن آپ کا ڈاکٹر آپ کی لئے حفاظتی علاج تجویز نہیں کرتا۔ اگر آپ مستقبل میں طویل کھانسی (تین ہفتوں سے زیادہ)، رات کے پسینے، بخار یا وزن میں کمی کا شکار ہیں، تو آپ کو مستقبل میں تپ دق کا معائنہ کرنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو حامل ہے، یا انسولین سے ذیابیطس کا علاج کر رہے ہیں، گردے کی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، کینسر کا علاج کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے کمزور مدافعتی نظام رکھتے ہیں، تو آپ کو نیز ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔

رابطے کی معلومات (Kontaktuppgifter)

استقبالیہ کا نام (Namn på mottagningen)

.....

ٹیلی فون نمبر / استقبالیہ کے لیے ٹیلی فون کا وقت (Telefonnummer/tefontid till mottagningen)

.....

SMITTSKYDD SKÅNE

040-33 71 80

