

Patientinformation

Till dig som är gravid och ordinerats Trombyl

Du är gravid och har ordinerats Trombyl (acetylsalicylsyra) 75 mg till natten som förebyggande behandling, för att minska risken att du ska få havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och risken att barnet i magen ska bli tillväxthämmat.

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är en sjukdom som drabbar 2–8% av gravida kvinnor i världen. Havandeskapsförgiftning kan göra så att den blivande/nyblivna mamman blir sjuk, men kan också göra så att fostret inte växer som det ska i magen. Det kallas intrauterin tillväxthämning. Om den gravida eller fostret blir sjukt kan det innebära att barnet föds för tidigt.

Flera studier har visat att en låg dos av acetylsalicylsyra kan förebygga havandeskapsförgiftning och intrauterin tillväxthämning hos dem med hög risk.

Flera studier visar att effekten är störst om läkemedlet tas till natten, det vill säga när du går och lägger dig.

Du ska ta läkemedlet tills du är i graviditetsvecka 36 (utom i enstaka fall med särskilt hög risk då särskild ordination ges).

Du har blivit ordinerad 75 mg Trombyl till natten för att du har någon av dessa starka riskfaktorer:

- Du har antifosfolipidsyndrom
- Du har SLE
- Du har en kronisk njursjukdom
- Du har tidigare haft havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck under graviditet
- Du är gravid med hjälp av äggdonation
- Du har högt blodtryck sedan tidigare
- Du har diabetes typ 1 eller 2 sedan tidigare
- Du har tidigare väntat ett tillväxthämmat barn (IUGR) eller fött ett barn som var litet för tiden (SGA)
- Du väntar tvillingar eller trillingar

Eller för att du har minst tre av följande måttliga riskfaktorer:

- Du är förstföderska
- Du har en förstagrads släkting som har haft havandeskapsförgiftning
- Du har ett BMI på 30 eller mera
- Du är över 40 år
- Det var över 10 år sedan du fick barn senast
- Du hade ett blodtryck över 130 mmHg i övertryck eller 80 mmHg i undertryck vid inskrivning hos barnmorskan
- Du har afrikanskt ursprung
- Du har obstruktiv sömnapné, andningsuppehåll när du sover

Om du har frågor kring medicinen eller varför du ska ta den kan du vända dig till din barnmorska, men det är viktigt att du inte väntar med att börja.

Behandlingen måste starta tidigt i graviditeten för att ha bästa effekt.