

Ultraljudsundersökning och vävnadsprov från prostatakörteln

Transperineal vävnadsprovtagning

Du får denna broschyr inför ditt besök på urologimottagningen för ultraljudsundersökning och vävnadsprovtagning från prostatakörteln.

Om du tar något av de blodförtunnande läkemedel vi listar nedan, behöver du höra av dig till oss en vecka innan ditt besök. Detta för att undvika en större blödning då vi tar vävnadsprov från prostatakörteln. Hör av dig om du tar något av dessa läkemedel:

- Trombyl[®] (Acetylsalicylsyra) om dos över 75mg/dag
- Waran[®]
- Eliquis[®]
- Pradaxa[®]
- Xarelto[®]
- Lixiana[®]
- Brilique[®]
- Klopido­gre­l[®]



Transrektalt ultraljud

För att kunna se prostatakörteln under vävnadsprovtagningen, gör läkaren en ultraljudsundersökning av prostatakörteln. Det innebär att läkaren för in ett stavformat instrument några centimeter in i ändtarmen. På staven finns en ultraljudssändare/mottagare som ger en bild av prostatan på en bildskärm. Det är fördelaktigt om man har tömt tarmen innan besöket.

Transperineal vävnadsprovtagning från prostata

Transperineala vävnadsprover från prostatakörteln tas via huden i området mellan pungen och ändtarmen (perineum) till skillnad från transrektala vävnadsprover som tas via ändtarmen. Den transperineala metoden minskar risken för att drabbas av infektion efter provtagningen.

Först tvättar man, därefter för man in en ultraljudsstav i ändtarmen. Med ultraljud som vägledning lägger läkaren lokalbedövning för att sedan ta vävnadsproverna från prostata.

Besöket tar ca 30-45 minuter.

Proverna skickas för mikroskopisk analys. Det tar ett några veckor innan du får resultatet av provtagningen.

Lugnande medel inför undersökningen

Om du vet med dig att du tycker att stick med nålar är obehagligt, finns möjlighet att få lugnande tabletter inför undersökningen. Vi ber dig i så fall höra av dig till oss en vecka innan ditt besök. Du behöver då komma till vår mottagning en timme före själva undersökningen för att medicinen ska hinna ha effekt. Om du får lugnande medel i samband med undersökningen får du inte köra bil tills effekten av medicinen har klingat av, vilket kan ta några timmar. Det kan i så fall vara lämpligt att du tar dig till mottagningen på annat sätt än med egen bil.

Efterverkningar

Efter undersökningen kan det förekomma blod i urinen och sädesvätskan. Det är sällan allvarligt. Blod i urinen försvinner inom ett par dagar, och blod i sädesvätskan kan förekomma under någon månad. Drick extra mycket de första dagarna efter undersökningen för att skölja igenom urinblåsan. En inte så vanlig efterverkning kan vara oförmåga att tömma urinblåsan. Skulle detta inträffa så behöver man snarast ta kontakt med en jourmottagning /akutmottagning och få en kateter ett par dagar. I övrigt kan du leva som vanligt efter biopsitagningen.

Även om risken för infektion efter transperineala biopsier är mycket låg, rekommenderas att du vid feber eller sjukdomskänsla uppsöker närmaste akutmottagning och informerar om att du genomgått vävnadsprovtagning från prostata.

På grund av infektionsrisken kan det vara olämpligt att resa inom två veckor efter ditt planerade besök. Kontakta urologmottagningen om du har frågor.

Biobankslagen

Vi kommer att spara ditt vävnadsprov i Biobanken, om du inte aktivt säger nej till det. För mer information, kontakta din behandlande läkare.