

Rapporter att plocka fram ur Infektionsverktyget

1) Antal infektioner på er vårdenhet under det senaste året, fördelat per månad samt på samhällsförvärvade/vårdrelaterade infektioner:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Infektioner" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Klicka "Välj" i rullistan. Klicka på plustecknet bredvid ert sjukhus (t.ex. "Skånes universitetssjukvård"). Kryssa i rutan framför er enhet (t.ex. "VE ortopedi"). Klicka "Ok".

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Tid-år-månad"

Kryssa i "Vård/samhälle"

2) Fördelning av vårdrelaterade infektioner på er klinik per månad:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Infektioner" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Vård/samhälle". Välj "Vårdrelaterad"

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Tid-år-månad"

Kryssa i "Infektion"

Alternativ: För att istället se fördelning av samhällsförvärvade infektioner väljs detta under *Avgränsa uppföljningsinformation*.

3) Fördelning av antibiotika som används för behandling vid er klinik:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Antibiotikaordinationer" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Behandling/profylax". Välj "Behandling"

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Antibiotika (ATC)". I rullistan, välj "Antibiotika (ATC) - Kemiska substansgrupper".

Alternativ: För att istället se fördelning av antibiotika vid profylax väljs detta under *Avgränsa uppföljningsinformation*.

4) Antibiotikabehandling av vissa förvalda samhällsförvärvade infektioner:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Antibiotikaordinationer" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Ordinationsorsak": Välj ur rullistan den infektion ni är

intresserade av (t.ex. "Urinvägsinfektion utan feber")

Kryssa i "Vård/samhälle": Välj "Samhällsförvärvad".

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Antibiotika (ATC)". I rullistan, välj "Antibiotika (ATC) Kemiska substansgrupper".

Då man tittar på UVI utan feber kan det även vara aktuellt att titta på könsfördelning. Kryssa då i "Kön".

Presentera som cirkeldiagram.

Observera att det kan komma med många antibiotika, där felregistrering kan ha förekommit. Genom att *avgränsa uppföljningsinformationen* under Antibiotika (ATC) till endast relevanta preparat kan en presentation förfinas.

Alternativ 1: För att istället se fördelning av vårdrelaterade infektioner väljs detta under *Avgränsa uppföljningsinformation*.

Alternativ 2: Vill ni titta på första resp. efterföljande ordination kan detta väljas under *Fördela uppföljningsinformation på* – "Första/efterföljande ordination".
Presentera som staplat stapeldiagram (ikonen näst längst ut till höger).

Följande exempel är tänkta att användas för kvalitetssäkring:

5) Andel VRI/mån inom slutenvården på er vårdenhet, fördelat per vårdtillfälle

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Vårdtillfällen" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Infektion": Kryssa i samtliga vårdrelaterade infektioner. (OBS! Tio kryss i rullistan!)

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Tid-år-månad"

Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare):

Välj "Vårdtillfälle" i rullistan.

Avgränsa nämnare

Avmarkera "Infektion" i rullistan.

6) Antibiotikamått att följa senaste året:

Här följer exempel på hur utvalda antibiotika används vid olika infektioner, för utvärdering av regionala antibiotika-rekommendationer. Vi har tagit fram fyra exempel.

Nedre UVI utan feber hos kvinnor:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Antibiotikaordinationer" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Antibiotika (ATC)": Klicka "Välj". Klicka på plustecknet bredvid "Antiinfektiva medel för systemiskt bruk". Klicka bredvid "Antibakteriella medel för systemiskt bruk" Klicka bredvid "Antibakteriella betalaktamer, penicilliner". Klicka bredvid "Penicilliner med utvidgat spektrum" och kryssa i "[Pivmecillinam](#)". Klicka bredvid "Övriga antibakteriella betalaktamer". Klicka bredvid "Cefalosporiner, första generationen" och kryssa i "[Cefadroxil](#)". Klicka även bredvid "Cefalosporiner, tredje generationen" och kryssa i "[Ceftibuten](#)". Kryssa i "Sulfonamider och trimetoprim" (hela gruppen – för att få med [Trimetoprim](#) och [TrimSulfa](#)) samt "Antibakteriella kinolonderivat" (hela gruppen – för att få med [Ciprofloxacin](#), [Norfloxacin](#), [Levofloxacin](#) och [Moxifloxacin](#)). Klicka bredvid "Övriga antibakteriella medel" och kryssa i "[Nitrofuranderivat](#)".

Kryssa i "Ordinationsorsak": Välj "Urinvägsinfektion utan feber"

Kryssa i "Kön": Välj "K"

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Antibiotika (ATC)". I rullistan, välj "Antibiotika (ATC) - Kemiska substansgrupper".

Presentera som cirkeldiagram.

Samhällsförvärd pneumoni:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Antibiotikaordinationer" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Antibiotika (ATC)": Klicka "Välj". Klicka på plustecknet bredvid "Antiinfektiva medel för systemiskt bruk". Klicka bredvid "Antibakteriella medel för systemiskt bruk" Klicka bredvid "Antibakteriella betalaktamer, penicilliner". Klicka bredvid "Betalaktamaskänsliga penicilliner" och kryssa i "[Bensylpenicillin \(penicillin G\)](#)". Klicka bredvid "Övriga antibakteriella betalaktamer". Klicka bredvid "Cefalosporiner, tredje generationen" och kryssa i "[Cefotaxim](#)".

Kryssa i "Ordinationsorsak": Välj "Lunginflammation".

Kryssa i "Vård/samhälle": Välj "Samhällsförvärd".

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Antibiotika (ATC)". I rullistan, välj "Antibiotika (ATC) - Kemiska substansgrupper".

Presentera som cirkeldiagram.

Bukinfektion:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Antibiotikaordinationer" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Antibiotika (ATC)": Klicka "Välj". Klicka på plustecknet bredvid "Antiinfektiva medel för systemiskt bruk". Klicka bredvid "Antibakteriella medel för systemiskt bruk" Klicka bredvid "Antibakteriella betalaktamer, penicilliner". Klicka bredvid "Kombinationer av penicilliner, inklusive kombinationer med betalaktamashämmare" och kryssa i "[Piperacillin och enzymhämmare](#)". Klicka

bredvid "Övriga antibakteriella betalaktamer". Kryssa i "Karbapenemer" (hela gruppen – för att få med [Meropenem](#), [Ertapenem](#) och [Imipenem med enzyminhämmare](#)). Klicka bredvid "Cefalosporiner, tredje generationen" och kryssa i [Cefotaxim](#).

Kryssa i "Ordinationsorsak": Välj "Akut bukinfektion/peritonit".

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Antibiotika (ATC)". I rullistan, välj "Antibiotika (ATC) - Kemiska substansgrupper".

Presentera som cirkeldiagram.

Hud- och mjukdelsinfektion:

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Antibiotikaordinationer" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Klicka "Senaste året" i rullistan.

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Antibiotika (ATC)": Klicka "Välj". Klicka på plustecknet bredvid "Antiinfektiva medel för systemiskt bruk". Klicka bredvid "Antibakteriella medel för systemiskt bruk" Klicka bredvid "Antibakteriella betalaktamer, penicilliner". Kryssa i "Betalaktamasresistenta penicilliner" (hela gruppen – för att få med [Kloxacillin](#) och [Flukloxacillin](#)). Klicka bredvid "Makrolider, linkosamider och streptograminer".

Kryssa i "Linkosamider" (för att få med [Klindamycin](#)).

Kryssa i "Ordinationsorsak": Välj "Annan hud-/mjukdels-/skelettinfektion".

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Antibiotika (ATC)". I rullistan, välj "Antibiotika (ATC) - Kemiska substansgrupper".

Presentera som cirkeldiagram.

Alternativ: Välj istället "Rosfeber" som ordinationsorsak under *Avgränsa uppföljningsinformation* och lägg till "[Bensylpenicillin \(penicillin G\)](#)" och "[Fenoximetylpenicillin \(penicillin V\)](#)" under *Avgränsa uppföljningsinformation*.

7) Andel postoperativa infektioner per valbart ingrepp

Observera att för att denna informationsmängd ska vara tillgänglig behöver postoperativa infektioner *kopplas* till respektive åtgärdskod. Detta görs i en särskild modul i Infektionsverktuget, där verksamhetens postoperativa infektioner listas och manuellt kan kopplas ihop med mest relevanta åtgärdskod. Notera också att postoperativa infektioner som registrerats i annan verksamhet inte syn i denna lista.

Information att följa upp (Y-axel):

Välj "Kirurgiska ingrepp" i rullistan.

Avgränsa uppföljningsinformation:

Kryssa i "Tidsperiod": Välj senaste året (se punkt 1 för instruktioner)

Kryssa i "Organisatorisk enhet": Välj er enhet (se punkt 1 för instruktioner).

Kryssa i "Postoperativ infektion": Välj både djup och ytlig postoperativ infektion i rullistan.

Kryssa i "Åtgärd/ingrepp": Välj den åtgärd/det ingrepp ni är intresserade av att följa i rullistan (som är baserad på KVÅ-koder).

Fördela uppföljningsinformation på:

Kryssa i "Tid-år-månad"

Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare):

Välj "Kirurgiska ingrepp" i rullistan.

Avgränsa nämnare:

Klicka bort "Postoperativ infektion" (annars blir resultatet 100%).

OBS! För att se antalet postoperativa infektioner resp. totala operationer inom valt ingrepp: Klicka på "Data" bredvid Diagram där diagrammet visas.