


Datum 22-04-07

## Information gällande ePed-stöd i Melior och problem kopplat till ordinationsmallar med =ordination där dos är angiven

Vid insättning av ordinationsmall som innehåller =ordination där ordinerad dos överskrider eller underskrider gränserna i ePeds rimlighetskontroll får ordinatören **inte** upp varningsrutan (se nedan), utan kan klicka vidare utan att ange tvingande kommentar.



Sätt in

Morfin inf/inj. 1 mg/mL (späd enl ePed)

Tillsats till:

Ordningsorsak: test      Kommentar:

Datum: 2022-03-29      Administrationssätt: iv      Dosenhet: ml      Läkemedelsinstruktion: Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL      Instruktion

**Dosering**

Dos (mg/kg): 1,9      Dos (mg): 19      4(20)

Skapa utd från första

Adm. tid

Dos per kg

Dos i mängd verksam

Dos

**Mätvärden**

Ålder: 15 år

Ord. vikt: 10.0 kg

Reg. vikt: 10.0 kg

Maxdos:      ml/dygn

Pila (dagar): 0      Infusionshastighet:      h

Nyinsatt

Skapa recept

Sköter själv


Skapa passerade utdelningstillfällen

Föreslå ej synonymbyte

Anvisning:

OK      Avbryt

Ordnationen visas dock med röd ikon för orimlig dos.



Med anledning av detta är det viktigt att varje verksamhet är medveten om problematiken för bedömning och ställningstagande till fortsatt hantering av nämnda ordinationsmallar. Vår rekommendation är att i största utsträckning undvika ordinationsmallar med = ordination för att ePeds rimlighetskontroll ska fungera som avsett.

## Förvaltningsgrupp Läkemedelssystem



Datum 22-04-07

Viktigt i sammanhanget att belysa dels att rimlighetskontrollen är ett stöd och inte tillgänglig för samtliga läkemedel, dels att den som iordningställer och administrerar ett läkemedel enligt *Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården* (HSLF-FS 2017:37 §10) ansvarar för att kontrollera att dosen är rimlig. Ikonen för rimlighetskontroll kommer fortsatt signalera och vara rödmarkerad vid orimlig dos. Om röd varning visas utan kommentar från ordinerande läkare ska ansvarig läkare kontaktas för att säkerställa att ordinationen stämmer. Om grå markering visas (rimlighetskontroll saknas) ska man kontrollera dosen på annat sätt, tex läsa i ePed-instruktionen om sådan finns eller FASS/annat PM.