

PMO-guide Primärvården

Läkemedel – Registrering av läkemedelsöverkänslighet



Läkemedelsöverkänslighet

En allvarlig läkemedelsöverskänslighet ska registreras i journalen så att en varningstriangel visas, registrering sker i modul *Varning*. Varning visas i PMO-journalen oavsett från vilken enhet den öppnas inom Region Skåne.

Registrering ska bedömas av läkare, men kan på uppdrag dokumenteras av annan personal. Läkaren är ansvarig och ska signera posten.

Vid förskrivning i modul *Läkemedel* kommer en varning om preparatet tillhör den ATC-kod som registrerats.

Observera att varningar enligt ATC-kod inte är heltäckande. De visas till exempel inte för kombinationspreparat, som kan ha en annan ATC-kod i ett annat terapiområde. Samma substans kan ha mer än en ATC-kod, om det används inom olika terapiområden.

Vid varje varning måste ansvarig läkare bedöma vilken ATC-nivå som är adekvat. Det är möjligt att sätta varningen på en högre ATC-kods nivå för att täcka in fler undergrupperingar. Om det redan finns en varning i PMO måste denna bedömas innan ny ordination görs.

Det är viktigt att dokumentera vilket som är det misstänkta utlösande preparatet, preparatets generiska substans (ATC-kod) och att ange symptomen på hur överkänsligheten yttrat sig i kommentarrutan.

Modul Obs

Kontrollera alltid om det finns någon felaktigt registrerad varning i modulen *Obs* som ska flyttas över till modul *Varning*.

När tidigare journalsystem migrerades till PMO låg det läkemedelsvarningar under *Obs*. Det går att få fram denna information via Rapportmodulen på Mitt arbete.

Rapporten heter *RS Alla OBS-registreringar* och beställs via PMO-supporten för utskjut. Be kontaktperson för PMO om hjälp med detta. Vi rekommenderar att denna rapport körs på alla enheter. Rapporter får köras före kl. 8 eller efter kl. 17.

PMO-guide Primärvården


Läkemedel – Registrering av läkemedelsöverkänslighet

Registrering av Varning

Öppna modul *Varning* i patientens journal, välj *Ny*.

Skriv in det läkemedel du misstänker utlöst reaktionen i textfältet och välj ATC-kod, bedöm vilken ATC-kodnivå som är korrekt eftersom samma substans kan ha mer än en ATC-kod om det används inom olika terapiområden eller i kombinationspreparat. Under *Kommentar* ska du fylla i hur reaktionen yttrade sig.

Exempel med 7-ställig ATC-kod:



Ny varning
Avbryt Spara Signera

Text:
Kåvepenin

ATC-kod... Radera ATC

J01CE02 Fenoximetylpenicillin


Kommentar:
Generell urticaria och kraftiga andningsbesvär 4 timmar efter intag av 1 tablett 800 mg.

Nya varningar:

Text	ATC-kod	ATC-beskrivning
------	---------	-----------------

Ny Radera

Exempel med 4-ställig ATC-kod:



Ny varning
Avbryt Spara Signera

Text:
Kåvepenin

ATC-kod... Radera ATC

J01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner

Kommentar:
Generell urticaria och kraftiga andningsbesvär 4 timmar efter intag av 1 tablett 800 mg.


Nya varningar:

Text	ATC-kod	ATC-beskrivning
------	---------	-----------------

Ny R

Om det gäller fler läkemedel klicka på *Ny* och upprepa enligt ovan. Signera.

När du öppnar en journal som har en registrerad *Varning* kommer det upp ett Popup-fönster, detta kan inte väljas bort. Du måste klicka *Stäng* eller *Enter* för att komma vidare och kunna arbeta i journalen.



Varningar Kryh, Clara Josefina Amanda

Varning!

2020-01-28 ASA
ATC: J01C
Text: Kåvepenin
Kommentar: Generell urticaria och kraftiga andningsbesvär 4 timm...

2019-12-12 ASA
ATC: J01CA04
Text: Amoxicillin
Kommentar: Anafylaktisk chock

Stäng Hjelp